

# OXALIPLATIN INJECTION

## 奥沙利铂用药小贴士- 常见不良反应

本手册仅做医学科普，不作诊疗意见，详细情况请阅读说明书

化疗是治疗肿瘤疾病的三大手段之一，对肿瘤细胞进行杀灭的一种治疗方法。但因化疗药物在杀灭肿瘤细胞的同时也对人体正常细胞有不同程度影响，所以不同化疗药带来疗效的同时也导致不同的不良反应，常见不良反应如：胃肠道不良反应、骨髓抑制、神经系统毒性、皮肤不良反应等；

提前了解化疗中可能出现的不良反应及预防、处理措施，以正确的态度面对不良反应，有助于保证疗效且改善患者治疗过程中生活质量。

接下来，让我们一起来了解一下吧！

# 奥沙利铂 - 常见不良反应之过敏反应

正确认识

科学处理

加强防范

\*医学科普仅供参考, 不作诊疗建议, 详情请咨询医务人员

## 1. 若发生过敏反应, 有哪些症状呢?

**表现:**出汗、面部潮红、支气管痉挛、呼吸短促、瘙痒、荨麻疹、面部肿胀、低血压等, 严重者会发生过敏性休克, 任何给药周期都可能发生过敏反应, 奥沙利铂过敏常发生在化疗多疗程后, 特别是5~6疗程, 需进行密切监测。

分度	临床表现
I 度	一过性面部潮红或皮疹, 药物热 $< 38^{\circ}\text{C}$
II 度	面部潮红、皮疹、呼吸困难、药物热 $\geq 38^{\circ}\text{C}$
III 度	明显的支气管痉挛伴或不伴风疹, 需要立即处理, 过敏反应相关性或血管源性水肿, 血压下降
IV 度	急性过敏反应 (急速进展的风疹、呼吸抑制、血管塌陷、休克)
VII 度	死亡

## 2. 过敏反应预防和处理

### 轻中度过敏反应

1停、2对症、3延长、4遵医处理、5加强监测

1. 立即停止输注;
2. 遵医嘱用药对症处理;
3. 下次使用奥沙利铂前, 延长铂类药物的输注时间, 遵医嘱药物预处理: 给予地塞米松、苯海拉明、西咪替丁/雷尼替丁等药物;
4. 必要时备好抢救用物, 用药期间严密监测;

### 重度过敏反应

1停、2换、3吸氧、4快速用药、5液体复苏很重要  
6期间严密监测生命体征

1. 立即停止输注;
2. 更换输液器;
3. 取休克卧位, 采用高流量吸氧;
4. 遵医嘱用药: 肾上腺素、地塞米松等;
5. 保证静脉通道通畅, 遵医嘱及时补液;
6. 期间严密监测心电、血压及血氧饱和度;

# 奥沙利铂

## 常见不良反应之神经毒性

正确认识

科学处理

加强防范

\*医学科普仅供参考,不作诊疗建议,详情请咨询医务人员

### 1.若发生神经毒性,有哪些症状呢?

#### 急性神经毒性

**表现:**一过性的感觉异常、感觉迟钝、感觉减退,或发生急性咽喉感觉异常综合征(伴吞咽困难和/或呼吸困难的主观感),患者主诉:呼吸不畅、手麻有触电等感觉;遇冷更容易触发急性神经毒性或使症状加重,多数患者在输注的数小时内会出现,但一般为轻度,在几小时或几天内可缓解。

#### 慢性神经毒性

**表现:**是一种累积性、可逆性的末梢感觉神经病变,多发生在化疗几周期之后,精细动作协调困难,包括书写,系纽扣,握物品;治疗终止后患者大部分可缓解;



手脚发麻



喉痉挛



严重时四肢抽搐

### 2.神经毒性预防和处理

- 1.延长输注时间2~6小时,可减少咽喉感觉异常等的发生;
- 2.对症处理:遵医嘱可以使用维生素E、度洛西汀、钙镁合剂、谷胱甘肽等药物治疗;
- 3.治疗过程中有任何不适应立即告诉医务人员;

#### 一定要注意

遇事不慌张、及时报告、全副武装、远离冷刺激  
饮食温热、温水洗漱、不用铝制品、局部多按摩

- 1.发生异常时,切勿惊慌,及时通知医务人员;
- 2.注意保暖,可佩戴口罩、帽子、手套手套;
- 3.避免面吹冷空气,夏日空调房中披间外套,避免接触床档、输液架等金属器物,减少因冷刺激而加重肢端麻木;
- 4.用温水刷牙,不要进食冷品,避免因低温诱发喉痉挛;
- 5.不可用含铝制品烧水;
- 6.对感觉异常部位多按摩,防止肌肉挛缩变形,改善局部循环,促进神经再生,以利于康复;

# 奥沙利铂

## 常见不良反应之血液毒性&血管刺激性

正确认识

科学处理

加强防范

\*医学科普仅供参考,不作诊疗建议,详情请咨询医务人员

### 1.若发生血液毒性,有哪些症状呢?

**表现:**粒细胞、白细胞减少、血小板减少和贫血等,患者会出现发热、疲乏、贫血、皮肤粘膜出血、月经过多等情况。

### 2.血液毒性的预防和处理



一定要注意预防

- 1.给患者创造一个整洁、舒适的环境,做好病房地面消毒以及室内通风;
- 2.嘱咐患者多休息少活动,避免身体出现外伤或挤压;
- 3.保证患者有充足的睡眠和营养;
- 4.食物多以易消化且半流质为主,避免划伤;
- 5.可实行物理降温,避免体温过高;
- 6.保持患者皮肤清洁,口腔鼻腔的清洁,家属加强观察患者是否有血便、血尿等症状;
- 7.定期监测血常规。



对症处理:遵医嘱使用升白针、输血小板等治疗

### 1.若发生血管刺激性,有哪些症状呢?

**表现:**输注过程中可引起疼痛、罕见引起组织坏死等,需避免药物外渗;

当发生药物外渗时

1停、2抬、3回抽、4热敷

- 1.立即停止输注,勿冲管,避免外渗部位加压;
- 2.抬高患肢,保留针头;
- 3.尽量回抽渗漏在皮下的药液(遵医嘱应用10%硫代硫酸钠等药物局部浸润注射);
- 4.采取局部热敷的方法,15~20min/次,每日至少4次;



汇宇制药  
HUIYU PHARMACEUTICAL

# 奥沙利铂

## 常见不良反应之胃肠道反应

正确认识

科学处理

加强防范

\*医学科普仅供参考,不作诊疗建议,详情请咨询医务人员

### 1.若发生胃肠道反应,有哪些症状呢?

**表现:**恶心、呕吐、腹泻、口腔炎、黏膜炎、腹痛、便秘等,会降低患者的生活质量,还会导致水电紊乱、脱水、感染,严重可致休克。

### 2.胃肠道反应预防和处理



#### 一定要注意预防

- 1.注意饮食,以容易消化、清淡为主,忌辛辣刺激的食物;
- 2.尽量避免环境的刺激,如异味、污物等;
- 3.呕吐后给予患者温水进行漱口将呕吐物进行清理;
- 4.给予患者心理护理,可利用适当活动、娱乐以及音乐等方法将患者注意力分散,让呕吐恶心等症状减轻;
- 5.患者腹泻的护理:对患者大便颜色、量、性状以及次数进行观察和记录,对血电解质变化进行检测,若有异常需及时处理;
- 6.加强口腔护理:禁烟禁酒,饭后以生理盐水进行漱口等;

#### 对症处理



#### 遵医嘱用药

例如:阿瑞匹坦、帕罗洛司琼、地塞米松,甲氧氯普胺、苯海拉明、乳果糖、奥美拉唑等药物治疗。



汇宇制药  
HUIYU PHARMACEUTICAL

